X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica

"Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución"

12 al 17 de abril de 2015
Universidad Católica Argentina

Dr. Ariel Durán
Cardiólogo Intervencionista
Hospital Universitario
Montevideo-URUGUAY

X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica

"Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución"

12 al 17 de abril de 2015
Universidad Católica Argentina

Comunicación con la
Sociedad en PR
Papel de las Sociedades
Científicas
SOLACI

SOLACI se crea en 1995 con la finalidad de unificar y desarrollar el intervencionismo cardiológico de adultos y de niños en Latinoamérica

Unifica 20 países.

Un congreso y 3 Jornadas
anuales.

Programa SOL-SOLACI
Pro-Educar.

Novedades científicas on line.

X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica

"Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución"

12 al 17 de abril de 2015
Universidad Católica Argentina

El Comité de Seguridad radiológica de SOLACI fue creado en el año 2010 con la finalidad de agrupar un conjunto de cardiólogos intervencionistas y profesionales afines con interés en la radioprotección con la finalidad de escribir guías, realizar talleres, cursos o conferencias con el fin de diseminar los conocimientos al respecto en nuestra comunidad.

X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica

"Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución"

12 al 17 de abril de 2015
Universidad Católica Argentina

El motivo de su creación fue que, luego de tomar conciencia de que los cardiólogos intervencionistas son los profesionales de la salud con mayores dosis ocupacionales y que no se poseía un marco de enseñanza que permitiera proteger a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Se decidió entonces crear este Comité durante el ejercicio de la Comisión Directiva 2008-2010.

X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica

"Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución"

12 al 17 de abril de 2015
Universidad Católica Argentina

Fue entonces que decidimos incorporar a todas las actividades de las Jornadas y congresos SOLACI con cursos y miniconferencias no solo dirigidas a los cardiólogos intervencionistas sino también al personal de enfermería y técnico que trabaja en la sala.

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

XIII Jornadas SOLACI

5° Región Centroamérica y el Caribe

28/29 de Octubre de 2010

RLA9067
ATS 3

Retrospective Evaluation of Lens Injuries and Dose: RELID Study

**Durán A, Vaño E, Cabrera M, Durán G,
Echeverri D, Kleiman NJ**

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RELID STUDY

RLA9067

Objetivo

- ✘ Determinar la prevalencia de las opacidades radioinducidas entre los Cardiólogos Intervencionistas y el personal de sala de Hemodinamia mediante una evaluación retrospectiva.

RELID STUDY

RLA9067

Fundamentos

- ✘ La objetivación de dichas lesiones en los CI, Enfermeros y Técnicos que trabajan en una sala de Hemodinamia nunca había sido reportada previamente.
- ✘ El cristalino es uno de los órganos con mayor radiosensibilidad del organismo y su exposición a los Rayos X puede determinar opacidades y hasta cataratas.

RELID STUDY

RLA9067

Fundamentos

- ✘ La lesión característica es la opacidad subcapsular posterior (diferente a las opacidades producidas por otras enfermedades como la diabetes).
- ✘ Mientras que los estadios iniciales no producen deterioro de la visión, la progresión de estas lesiones puede conducir a cataratas y necesitar cirugía.

RELID STUDY

RLA9067

Fundamentos

- ✘ La latencia en aparecer dichas lesiones es inversamente proporcional a la dosis recibida (efecto determinista).
- ✘ Los CI permanecen la mayor parte del tiempo muy próximos a los pacientes por lo que la dosis de radiación dispersa recibida durante los procedimientos puede ser muy alta.

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RLA9067

RELID STUDY

RADIOSENSIBILIDAD

High

- × Eye lens
- × Bone marrow
- × Spleen
- × Lymph nodes
- × Gonads
- × Thymus

Intermediate

- × Skin
- × Mesodermic organs:
 - × Liver
 - × Heart
 - × Thyroid
 - × Lungs

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RELID STUDY

RADIOSENSIBILIDAD

Las radiaciones ionizantes pueden producir coagulación de las proteínas del cristalino que terminan en opacidades.

Opacidades
radioinducidas

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RLA9067

RELID STUDY

Métodos

- Durante 2 Jornadas de SOLACI realizadas en Bogotá (Colombia) en septiembre de 2008, en Montevideo (Uruguay) en abril de 2009 y en el 16° Congreso SOLACI en agosto 2010 en Buenos Aires (Argentina) 110 CI y 123 Enfermeros o Técnicos aceptaron ser sometidos a dilatación pupilar y examen con lámpara de hendidura.

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RLA9067

RELID STUDY

Métodos

- Aceptaron además llenar un formulario con su historia médica, su carga de trabajo en relación a número y tipo de procedimientos, características del equipo radiológico utilizado y el uso o no de elementos dosimétricos y radioprotectores (personales y de la sala).

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RLA9067

RELID STUDY

Métodos

- ✘ Se examinó un grupo control de 93 personas de edad y sexo similar sin exposición profesional a radiaciones ionizantes.
- ✘ La evaluación del cristalino se realizó por 4 oftalmólogos distintos en forma independiente y se documentó digitalmente.

SCORE	APPEARANCE			DESCRIPTION
	Anterior	Posterior	Sagittal	
0				Transparent Lens...NO opacities or dots discernible posteriorly OR anteriorly
0.5				Anterior OR posterior region* has ≤ 4 dots AND the other is transparent
1.0				Anterior OR posterior region has > 4 dots AND the other is transparent
1.5				One region has > 4 AND the other ≤ 4 dots
2.0				Both anterior AND posterior have > 4 dots
2.5				"Cloudy Skies". Vitreous visible through scattered anterior opacification
3.0				Posterior viewable but not vitreous AND anterior has scattered opacification
3.5				Total posterior opacity AND anterior near totally opaque with only occasional breaks
4.0				Anterior cortex completely opaque preventing viewing beyond superficial layers

* Posterior Region is defined as the superficial cortex, which includes the Posterior Subcapsular (PSC) area.

SCORE DE MERRIAM-FOCHT

Características basales

Grupo	Edad media (años)	Rango (años)	Tiempo trabajando (media en años)	Rango (años)
Cardiólogos Interv.	46 ± 8	30-69	14 ± 8	1-40
Enfermeras y Técnicos	32 ± 7	20-66	7 ± 5	1-30
Grupo control	41 ± 10	20-66	n/a

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

Resultados

Grupo	n	Individuos con opacidades subcapsulares posteriores en uno o los 2 ojos	%	Valor de p (comparada con grupo control)
Cardiólogos	110	49	45	< 0.005
Enfermeros y Técnicos	123	39	32	0.006
Grupo control	93	11	11.8

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RLA9067

RELID STUDY

Resultados

- ✘ 26/49 (53%) CI poseían cambios bilaterales con cambios con score de Merriam-Focht entre 0.5 – 1,5.
- ✘ 28/49 CI (57%) nunca o “infrecuentemente” usaban protección ocular.
- ✘ 30/49 CI (61%) nunca o “infrecuentemente” usaban mampara suspendida del techo.
- ✘ 12/39 (31%) de las enfermeras tenían cambios bilaterales entre 0.5 y 1.5.

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RELID STUDY

Resultados de Buenos Aires (58 CI)

- ✘ De los 29 que tenía OSP solo 12 usaban mampara y de los 29 sin lesiones la usaban 21.
- ✘ Solo 1 de cada grupo conocen sus dosis (3%) y ninguno la de sus pacientes.

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RLA9067

RELID STUDY

Conclusiones

- ✘ Se trata del estudio más grande que determina la frecuencia de opacidades radioinducidas en el cristalino de una población vinculada a CI.
- ✘ La elevada tasa de OSP observada en los CI (45%) apoya la imperiosa necesidad de mejorar el entrenamiento en radioprotección así como el uso de todos los elementos radioprotectivos que sea posible.

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RLA9067

RELID STUDY

Conclusiones (2)

- **La elevada tasa de opacidades del cristalino en los Enfermeros y Técnicos (32%) comparada con el grupo control sugiere el riesgo ocular de estos trabajadores.**

IAEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

RLA9067

RELID STUDY

Conclusiones (3)

- Estos hallazgos pueden ayudar a las Autoridades Reguladoras Nacionales a insistir en las recomendaciones y a proveer una red de trabajo en relación a la bioseguridad en los laboratorios de CI de nuestros países.

Radiation Cataract Risk in Interventional Cardiology Personnel

Eliseo Vano,^{a,1} Norman J. Kleiman,^{b,1,2} Ariel Duran,^{c,2} Madan M. Rehani,^{d,2} Dario Echeverri^e and Mariana Cabrera^f

^a *Radiology Department, Complutense University, Madrid, Spain;* ^b *Department of Environmental Health Sciences, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York, New York;* ^c *Invasive Cardiology, University Hospital, Montevideo, Uruguay;* ^d *International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria;* ^e *Fundación Cardio Infantil, Bogota, Colombia;* and ^f *Fundación Oftalmologica Nacional, Bogota, Colombia*

Vano, E., Kleiman, N. J., Duran, A., Rehani, M. M., Echeverri, D. and Cabrera, M. Radiation Cataract Risk in Interventional Cardiology Personnel. *Radiat. Res.* 174, 000–000 (2010).

of such changes increases progressively with dose until vision is impaired and cataract extraction surgery is required (5, 6, 8). The latency of such changes is inversely related to dose. During typical fluoroscopy working conditions, and if radiation protection tools are

X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica

"Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución"

12 al 17 de abril de 2015
Universidad Católica Argentina

El Comité además desea construir un foro donde los médicos o el resto del personal ocupacionalmente expuesto pueda volcar sus inquietudes o dudas y algún miembro del Comité poder responderlas.

X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica

"Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución"

12 al 17 de abril de 2015
Universidad Católica Argentina

Finalmente y luego de 1 año de trabajo y revisiones se escribieron las Guías SOLACI de Radioprotección en Cardiología Intervencionista, documento al que ya se puede acceder desde la nueva web.SOLACI.org desde febrero del año 2011.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!